

# 予防接種スケジュール

令和6年4月 浦添市 作成

種類	ワクチン名	費用	接種済みチェック	乳児期									幼児期						学童期													
				誕生	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6~8ヶ月	9~11ヶ月	12ヶ月	15ヶ月	18ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳			
定期接種	5種混合 〔DPT+不活化ポリオ (IPV)+ヒブ(Hib)〕	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③			④												①						生後2か月～1歳未満の間に5種混合ワクチンを20日以上の間隔を置いて3回初回接種終了後、6ヶ月以上の間隔を置いて(標準的な接種間隔として1年～1年6か月)、追加接種を1回	2期:11～12歳で2種混合(DT)を1回 (標準接種年齢は、11歳)		
	BCG	無料	<input type="checkbox"/>								①																		標準は生後5か月～生後8か月の間に1回			
	麻疹・風しん(MR)	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>											①															1期:生後12か月～2歳未満までに1回 2期:6歳になる年度の4月から3月の間に1回(小学校就学前の1年間)			
	日本脳炎	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														①②	③											1期初回:3歳児に6日以上の間隔で2回 1期追加:初回接種終了後、6ヶ月以上の間隔を置いて 4歳児で1回(全て7歳6か月未満までに接種)	2期:9歳で1回		
	小児用肺炎球菌 (15価結合型)	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③						④															3回(27日以上間隔)	生後12か月以降(標準的には生後12～15か月)に3回目終了後、60日以上の間隔を置いて1回。	※接種開始年齢によって必要な接種回数が異なります。 1歳未満の初回接種が生後7か月以上1歳未満の者:3回接種 2歳未満の初回接種が12か月以上2歳未満の者:2回接種 初回接種が2歳以上の者:1回接種	①の接種は6か月までに、②③の接種は1歳になる前までに接種しましょう。
	ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防ワクチン) 〔2価・4価・9価〕	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ※2回接種で可能な場合あり																										接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。詳しくは <a href="#">厚労省 HPV Q</a> で、ご確認ください。	対象:12歳になる年度の初日～16歳になる年度の末日までの間にある女子 標準的な接種年齢:中学1年生相当年齢		
	水痘(水ぼうそう)	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																										生後12か月～15か月の間に1回接種後、3ヶ月以上の間隔を置いて(標準的な接種間隔として6か月～1年)、生後36か月に至るまでの間に2回目接種			
	B型肝炎	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																											1歳未満のお子さんを対象とし、1回目から2回目は27日以上の間隔を置いて接種。1回目から3回目は139日以上の間隔を置いて接種。		
ロタウイルス	無料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																										1価ワクチン:生後6週～24週の間4週間以上の間隔を開けて2回接種 ※1価・5価どちらも1回目は、14週6日までに接種 5価ワクチン:生後6週～32週の間4週間以上の間隔を開けて3回接種				
任意接種	おたふくかぜ	全額自己負担	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																									①	1回 保育所など集団生活に入る子は早めに受けるとよいでしょう。	注(ワクチン接種によって自然感染によるブースター効果がなくなると、2回接種が必要)		
	インフルエンザ	全額自己負担	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																									毎年①②(10月、11月などに)13歳未満は2回(1～4週間隔)		13歳からは1回		

参考:「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」

は望ましい時期の例、①②などはワクチンの種類ごとに接種の回数を示しています。  
 は定期接種として可能な時期。

※実際に接種する予防接種とスケジュールについては、市町村の予防接種担当窓口、かかりつけ小児科医に相談しましょう。  
 ※法令等の改正に伴い、スケジュールが変更されることがあります。